

# INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN PARA COLONOSCOPIA CON GAVILYTE-H BISACODYL(SPLIT)

NOMBRE \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_

Debe hablar con alguien en el centro quirúrgico para confirmar su cita 2 días antes de su procedimiento.

## INSTRUCCIONES GENERALES:

- No tome medicamentos antiinflamatorios como Mobic, Ibuprofen, Advil, Motrin, Naproxen, Aleve, Celebrex, Bextra o otros medicamentos para la artritis durante 5 días antes de su procedimiento. Tylenol (acetaminofeno) está permitido.
- Hable con su médico si está tomando ASPIRINA, PRADAXA, XARELTO, PLAVIX, COUMADIN, HEPARIN, ELIQUIS, EFFIENT, BRILINTA o cualquier medicamento para diluir la sangre o prevenir la coagulación.
- Los aceites de pescado, las vitaminas Omega y la vitamina E deben suspenderse 5 días antes.
- Tome sus medicamentos para PRESIÓN ARTERIAL, CORAZÓN y PULMÓN la mañana de su procedimiento con un sorbo muy pequeño de agua.

## DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

**PASO 1:** Comience una dieta líquida clara por la mañana (sin alimentos sólidos ni productos lácteos). Es importante beber muchos líquidos para prevenir la deshidratación. Trate de tomar al menos 8 onzas de líquido cada hora.

**PASO 2: A las 8:00 a.m.,** mezcle la solución agregando agua tibia a la línea superior de la botella. Agitar bien. La solución debe ser clara e incolora. Refrigerar.

**PASO 3: a las 2:00 p.m.,** tome una tableta de bisacodilo con agua. NO mastique, triture ni rompa las tabletas. Permanecer cerca de los baños.

**PASO 4: a las 6:00 p.m.** comience a beber la solución de Gavilyte. Beba un vaso de 8 onzas cada 15 minutos hasta que la MEDIA botella se haya ido. Si tiene náuseas, deje de beber durante 15 minutos, luego comience a beber nuevamente. Puede continuar tomando líquidos claros hasta la medianoche.

**MAÑANA DE PROCEDIMIENTO:** \*\* SU ÚLTIMO VASO DEBE TERMINARSE 5 HORAS ANTES DE SU LLEGADA AL CENTRO O AL HOSPITAL \*\*

**PASO 5: 6 HORAS** antes de la hora de llegada de su procedimiento, comience a beber el resto de la solución. Beba un vaso de 8 oz cada 15 minutos hasta que la botella esté vacía. *Si tiene náuseas, deje de beber durante 15 minutos, luego comience a beber nuevamente.*

**\*\*\*\* NADA PARA COMER O BEBER DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, excepto el paso 5 y su medicación matutina con un sorbo de agua MUY PEQUEÑO \*\*\*\***

**\*ESTARÁS EN EL HOSPITAL O CENTRO POR APROXIMADAMENTE 2 HORAS.**

**\*DEBE TENER ALGUIEN DISPONIBLE PARA CONDUCIRLE A CASA.**